

SOINS APRÈS PERÇAGE

SOINS QUOTIDIENS – JUSQU'À LA GUÉRISON INITIALE

1 à 2 fois par jour : À l'aide d'un coton-tige ou d'une gaze, nettoyez délicatement la zone avec une solution saline stérile à 0,9 % (chlorure de sodium), sans additif.

Séchez doucement avec un coton-tige ou une gaze propre.

Durant la guérison, laissez les petites croûtes se ramollir et se détacher naturellement.

PRODUITS RECOMMANDÉS - DISPONIBLES EN BOUTIQUE OU EN PHARMACIE

Solution saline stérile à 0,9 % sans additif, compresses stériles (gaze) et cotons-tiges.

PRODUITS À ÉVITER JUSQU'À LA GUÉRISON INITIALE

Alcool à friction (70%), le peroxyde, les savons antibactériens agressifs, les huiles essentielles et les onguents (ex : Polysporin) sur le perçage. Ne pas mettre de crème, cosmétique ou maquillage près de la zone. Masquer l'oreille lors de la teinte des cheveux.

TEMPS DE GUÉRISON INITIALE APPROXIMATIFS

Lobes : 6 à 8 semaines ou plus

Cartilage (Helix, Tragus, Conch, Daith, Rook, etc.): 6 à 9 mois ou plus

Industriel : 9 à 12 mois ou plus


Après ce délai, vous devriez pouvoir changer de bijou par vous-même. Jusqu'à la guérison initiale, ne changez pas vous même le bijou et suivez ces recommandations:



Lavez-vous toujours les mains avant de toucher la zone percée.



Ne tournez pas le bijou et évitez de jouer avec celui-ci. Ne pas enlever le bijou.



Ne pas dormir sur l'oreille percée ou avec les cheveux mouillés. Utilisez un oreiller en forme de beigne.



Évitez les frottements et la pression : écouteurs, casque, téléphone...



Éviter de submerger la zone dans l'eau (bain, piscine, spa...) surtout durant le premier mois

Après 4 à 8 semaines : Prenez rendez-vous pour faire vérifier votre perçage. Une fois le gonflement diminué, certains bijoux doivent être raccourcis pour éviter les frottements et les irritations. Lobes, daith et anti-hélix : facultatifs. Industriel : évaluer après 2 semaines.

TEMPS DE GUÉRISON COMPLÈTE APPROXIMATIF

Lobes : 9 mois

Cartilage (Helix, Tragus, Conch, Daith, Industriel...): 1.5 à 2 ans

Après ce délai, vous pourrez généralement choisir parmi une plus grande variété de bijoux, en privilégiant des matériaux adaptés au perçage.



ateliernoiretor.com.
514.815.5568

RÉACTIONS NORMALES DURANT LA GUÉRISON :

LES PREMIERS 3 À 5 JOURS

- Rougeur légère, sensibilité et gonflement autour du perçage.
- Petit saignement ou ecchymose possible.
- Sensation de chaleur légère et inconfort localisé.

LES PREMIÈRES SEMAINES

- Formation de petites croûtes blanchâtres ou jaunâtres provenant des sécrétions de cicatrisation.
- Démangeaisons légères et sensibilité occasionnelle.
- Gonflement qui diminue progressivement.
- Une petite bosse peut parfois apparaître près du perçage en raison d'une irritation, d'un frottement ou d'une pression excessive. Si une bosse apparaît ou persiste, contactez-nous pour faire vérifier le perçage.

GUÉRISON COMPLÈTE

- Un perçage peut sembler guéri à l'extérieur alors que les tissus internes sont encore fragiles. La guérison varie selon l'emplacement, l'anatomie, les soins et les habitudes de vie.
- Une irritation peut survenir même après plusieurs semaines ou plusieurs mois.
- Même après la guérison complète, un perçage peut rétrécir ou se refermer rapidement si le bijou est retiré. Il est recommandé de garder un bijou en place pour préserver le perçage.

RÉACTIONS ANORMALES QUI NÉCESSITENT LA CONSULTATION MÉDICALE :

- Rougeur qui s'étend, douleur importante ou gonflement qui augmente.
- Écoulement épais et purulent, particulièrement s'il est accompagné d'une mauvaise odeur.
- Fièvre, frissons ou sensation de malaise.
- Bijou qui s'enfonce dans la peau ou semble s'y incruster.
- Réaction allergique importante ou persistante.
- En cas de signes d'infection, consultez rapidement un professionnel de la santé. Les infections du cartilage de l'oreille peuvent nécessiter une prise en charge rapide.
- Ne retirez pas vous-même le bijou si vous soupçonnez une infection, sauf indication d'un professionnel de la santé.

MIGRATION OU REJET DU BIJOU

Un rejet est toujours possible : le corps peut progressivement déplacer le bijou vers la surface de la peau. Le bijou peut sembler se déplacer, devenir plus visible sous la peau ou laisser apparaître une peau de plus en plus mince.

Si vous soupçonnez un rejet, contactez-nous rapidement pour faire évaluer votre perçage. Lorsqu'un rejet est confirmé, le retrait du bijou est généralement recommandé afin de limiter les cicatrices et de permettre à la zone de guérir. En présence de signes d'infection, consultez un professionnel de la santé avant de retirer le bijou.

AFTER PIERCING CARE

DAILY CARE – UNTIL INITIAL HEALING

1 to 2 times a day: Gently clean the area with sterile 0.9% saline solution (sodium chloride), without additives, using a cotton swab or gauze.

Gently pat dry with a clean cotton swab or gauze.

During healing, allow any crusts to soften and fall off naturally.

RECOMMENDED PRODUCTS – AVAILABLE IN-STORE OR AT PHARMACIES

Sterile 0.9% saline solution without additives, sterile gauze pads and cotton swabs.

PRODUCTS TO AVOID UNTIL INITIAL HEALING

Rubbing alcohol (70%), hydrogen peroxide, harsh antibacterial soaps, essential oils and ointments (e.g., Polysporin) on the piercing. Do not apply creams, cosmetics or makeup near the area. Protect your ear when dyeing your hair.

APPROXIMATE INITIAL HEALING TIMES

Earlobes: 6 to 8 weeks or longer

Cartilage (Helix, Tragus, Conch, Daith, Rook, etc.): 6 to 9 months or longer

Industrial: 9 to 12 months or longer


After this period, you should be able to change your jewelry yourself. Until initial healing is complete, do not change your jewelry yourself and follow these recommendations:



Always wash your hands before touching the pierced area.



Do not twist, play with or remove your jewelry.



Do not sleep on the pierced ear or with wet hair. Use a donut-shaped pillow.



Avoid friction and pressure: earbuds, headphones, phones...



Avoid submerging the area in water (bath, pool, hot tub...), especially during the first month.

After 4 to 8 weeks: Book an appointment to have your piercing checked. Once swelling has gone down, some jewelry needs to be shortened to prevent friction and irritation.

Earlobes, Daith and Anti-Helix: optional. Industrial: assess after 2 weeks.

APPROXIMATE FULL HEALING TIMES

Earlobes: 9 months

Cartilage (Helix, Tragus, Conch, Daith, Industrial...): 1.5 to 2 years

After this period, you can generally choose from a wider variety of jewelry, while prioritizing materials suitable for piercings.



ateliernoiretor.com

514.815.5568

NORMAL REACTIONS DURING HEALING:

THE FIRST 3 TO 5 DAYS

- Mild redness, tenderness and swelling around the piercing.
- Minor bleeding or bruising may occur.
- Mild warmth and localized discomfort.
-

THE FIRST FEW WEEKS

- Small whitish or yellowish crusts may form from normal healing discharge.
- Mild itching and occasional tenderness.
- Swelling gradually decreases.
- A small bump may sometimes appear near the piercing due to irritation, friction or excessive pressure. If a bump develops or persists, contact us to have your piercing checked.

FULL HEALING

- A piercing may appear healed on the outside while the tissue inside is still fragile. Healing varies depending on placement, anatomy, aftercare and lifestyle.
- Irritation may occur even after several weeks or months.
- Even after full healing, a piercing can shrink or close quickly if the jewelry is removed. Keeping jewelry in place is recommended to maintain the piercing.

ABNORMAL REACTIONS REQUIRING MEDICAL ATTENTION:

- Spreading redness, severe pain or increasing swelling.
- Thick, pus-like discharge, especially if accompanied by an unpleasant odor.
- Fever, chills or feeling unwell.
- Jewelry sinking into the skin or becoming embedded.
- Severe or persistent allergic reaction.
- If you notice signs of infection, seek medical attention promptly. Ear cartilage infections may require urgent treatment.
- Do not remove the jewelry yourself if you suspect an infection, unless instructed by a healthcare professional.

JEWELRY MIGRATION OR REJECTION

Rejection is always possible: the body may gradually push the jewelry toward the surface of the skin. The jewelry may appear to shift, become more visible beneath the skin or leave the skin increasingly thin.

If you suspect rejection, contact us promptly to have your piercing assessed. When rejection is confirmed, removing the jewelry is generally recommended to minimize scarring and allow the area to heal. If signs of infection are present, consult a healthcare professional before removing the jewelry.